



Vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 PREGUNTAS FRECUENTES

CentraCare y Carris Health suspenden la administración de la vacuna de Johnson & Johnson

¿Por qué CentraCare está pausando la administración de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19?

Como medida de precaución, CentraCare y Carris Health están pausando la administración de la vacuna de Johnson & Johnson (también conocida como Janssen) de acuerdo con las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Esto se debe a la aparición de casos poco frecuentes de mujeres jóvenes que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 y que posteriormente desarrollaron coágulos sanguíneos. Esta pausa les dará tiempo a los expertos para estudiar estos sucesos y determinar si estos casos están relacionados con la vacuna o con otras condiciones médicas subyacentes. La administración de la vacuna de Johnson & Johnson solo se reiniciará después de completar una exhaustiva revisión de los hallazgos.

Recibí la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Debería estar preocupado/a?

Según el Departamento de Salud de Minnesota, más de 184,000 habitantes de Minnesota han recibido la vacuna de Johnson & Johnson, sin embargo, la agencia manifiesta que no ha sido informada de ningún caso en el estado que haya desarrollado coágulos sanguíneos.

A nivel nacional, se han administrado más de 6.8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Los CDC y la FDA están revisando los datos que involucran seis casos reportados en los EE. UU. de personas que desarrollaron un tipo raro y severo de coágulos sanguíneos después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson. Aún no se determina la implicancia potencial de la vacuna en estos casos.

¿Cuándo debería buscar atención médica si recibí la vacuna de Johnson & Johnson?

Si recibió la vacuna de Johnson & Johnson y presenta dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación, debe comunicarse de inmediato con su proveedor de atención médica o acudir a una sala de emergencias.